

ФИО врача:

Телефон:

Примечания:

Таблица посещений

Пожалуйста, используйте данную таблицу, чтобы записывать даты посещений своего врача:

Дата посещения	Вид контрацепции	Результат теста на беременность	Подпись врача
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	



Памятка пациента при приеме Роаккутана®

Данный препарат подлежит дополнительному мониторингу. Это позволяет быстро выявлять овую информацию по безопасности.

Специалистам здравоохранения предлагается сообщать о любых подозреваемых нежелательных явлениях в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» on-line: раздел безопасность, заполнить on-line извещение о нежелательной реакции; по факсу +375 17 242 00 29; по e-mail: rcpl@roche.by; по почте: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

А также в «F.Hoffmann-La Roche» (Швейцария) в Республике Беларусь: по тел. (017) 256 23 08; по факсу (017) 256 23 06; по e-mail: belarus.safety@roche.com; по почте: ИООО «Рош Продактс Лимитед», 220073, г. Минск, 1-й Загородный пер., 20, 8-й этаж, кабинет 20

Роаккутан® не следует принимать во время беременности.

Роаккутан® может нанести серьезный вред не рожденному ребенку, если беременная женщина будет его принимать.

Если Вы беременны или подозреваете беременность, немедленно прекратите прием Роаккутана® и обратитесь к врачу.

Внимательно прочтите инструкцию по применению перед началом лечения.

Если у Вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу приема Роаккутана, обсудите их со своим врачом или фармацевтом.

Что следует делать, если у Вас есть вероятность возникновения беременности:

! Вам следует использовать, по крайней мере, один высокоэффективный метод контрацепции (такой как внутриматочное устройство или имплант) или правильно использовать 2 эффективных метода контрацепции, которые направлены на разные пути (такие как оральный контрацептив совместно с презервативом), перед началом терапии, на протяжении всего периода терапии и в течении 1 месяца после окончания терапии.

! Вы не должны забеременеть во время приема Роаккутана® или в первый месяц после окончания терапии.

! Вам необходимо регулярно посещать врача и регулярно выполнять тест на беременность:

- Перед началом терапии Вам нужно пройти тест на беременность, результат которого должен быть отрицательным.
- Чтобы убедиться, что Вы не беременны во время терапии, Вам следует регулярно выполнять тесты на беременность, предпочтительно ежемесячно, а также выполнить заключительный тест на беременность через 1 месяц после окончания терапии.

Напоминание для мужчин и женщин

Данный препарат выписан только для Вас. **Не делитесь этим препаратом с другими лицами и возвращайте неиспользуемые капсулы в аптеку.**

Карта напоминания для пациента

ФИО врача:

.....
.....
.....
.....

Телефон:

.....
.....

Примечания:

.....
.....